



XXIV. ARTHROPODES INSECTES 2

hyménoptères hémiptères phtiraptères phasmatodes mantophasmatodes blattodes orthoptères odonatoptères

Dans ce dossier, par ordre alphabétique : abeille, blatte, bourdon, cicadelle, cigale, criquet, fourmi, frelon, gendarme, grillon, guêpe, libellule, mante, phasme, pou, puceron, punaise, sauterelle, termite

HYMENOPTERES


Comment les reconnaître



Taille
 Quantité de venin libérée
 Comportement



	ABEILLE <i>Apis mellifera</i>	GUÊPE <i>Vespula vulgaris</i>	BOURDON <i>Bombus terrestris</i>
Taille	11 à 13 mm (ouvrière)	11 à 14 mm (ouvrière)	11 à 23 mm
Quantité de venin libérée	50 µg	2 à 10 µg	2 à 10 µg
Comportement	Peu agressive Piqûre d'autodéfense Meurt après la piqure	Assez agressive Peut piquer plusieurs fois	Peu agressif Piqûre d'autodéfense Peut piquer plusieurs fois



	FRELON EUROPÉEN <i>Vespa crabro</i>	FRELON ASIATIQUE <i>Vespa velutina</i>
Taille	18 à 35 mm (ouvrière)	17 à 32 mm
Quantité de venin libérée	2 à 10 µg	2 à 10 µg
Comportement	Piqûre très douloureuse Peut piquer plusieurs fois	Piqûre très douloureuse Peut piquer plusieurs fois

Chez toutes ces espèces, seule la femelle pique.